Bildiri No: **PB-029** **Doi:** 10.5606/phhb.dergisi.suppl2026.029

Rapid Onset Parkinsonism ile Başlayan Creutzfeldt–Jakob Hastalığı

Hanne Beyza Ayalan[1], Hafize Çotur Levent[2], Müge Kuzu Kumcu[1]

[1]*Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye*
[2]*Afyon Devlet Hastanesi, Afyon, Türkiye*

Amaç: Creutzfeldt–Jakob hastalığı (CJD), hızlı ilerleyici demans ve miyoklonus ile karakterize nadir bir prion hastalığıdır. Parkinsonizm genellikle hastalığın ileri evrelerinde görülmekle birlikte, nadiren hızlı başlangıçlı parkinsonizm kliniği ile prezente olabilir. Bu olgu sunumunda, rapid onset parkinsonizm ile başlayan ve kısa sürede tipik CJD bulguları gelişen bir hastayı literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: Bir ay önce hareketlerde yavaşlama ve dengesizlik şikâyeti başlayan 66 yaş kadın hasta, dış merkezde yapılan kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) normal ve elektromiyografi (EMG) sonrası polinöropati saptanarak tarafımıza yönlendirildi. Nörolojik muayenede geniş adımlı ataksik yürüyüş, diz fleksiyonunda kısıtlılık, boyun dahil belirgin rijidite ve bradikinezi mevcuttu; tremor saptanmadı. Hasta yatırılarak değerlendirildi, levodopa testine kısmi yanıt alındı ve rapid onset parkinsonizm ön tanısıyla rasajilin ve pramipeksol başlandı. Üç hafta sonraki kontrolde görsel halüsinasyonlar, miyoklonik atımlar, parkinsonizmde belirgin ilerleme, unutkanlık, oral alım bozukluğu ve yutma güçlüğü gelişti. Tekrarlanan kraniyal MRG'de FLAIR ve Diffüzyon ağırlıklı skenslarlarda kortikal "dantela" bulgusu ve nukleus kaudatuslarda hiperintensite saptandı. Klinik ve radyolojik bulgular doğrultusunda CJD tanısı konuldu. Miyoklonus için levetirasetam ve klonazepam başlandı, parkinsonizm için levodopa/karbidopa tedavisi sürdürüldü. Hasta perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) uygulanarak taburcu edildi.

Sonuç: Bu olgu, hızlı başlangıçlı ve hızla progresyon gösteren parkinsonizm tablolarında CJD'nin ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gerektiğini göstermektedir. Erken dönemde tanınması, gereksiz tedavilerin önlenmesi ve prognozun öngörülmesi açısından kritik öneme sahiptir.